

Die operative Behandlung des Empyems.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

unter dem Präsidium des

Herrn Geheimrath

Dr. J. N. Ritter von Nussbaum

k. Universitäts-Professor und Generalstabsarzt à l. s.

der

medizinischen Facultät zu München

vorgelegt von

Dietrich Lempke,

approb. Arzt.

München, 1884.

K. HOF- U. UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI V. DR. C. WOLF & SOHN.

Die operative Behandlung des Empyems.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

unter dem Präsidium des

Herrn Geheimrath

Dr. J. N. Ritter von Nussbaum

k. Universitäts-Professor und Generalstabsarzt à l. s.

der

medizinischen Facultät zu München

vorgelegt von

Dietrich Lempke,

approb. Arzt.

München, 1884.

K. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei v. Dr. C. Wolf & Sohn.

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Geheimrath

PROF. D^R. VON NUSSBAUM

als Zeichen

der Dankbarkeit und Hochachtung

der Verfasser.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Obgleich die operative Entleerung der eitrigen Exsudate bereits in den hippokratischen Schriften eine ausführliche Schilderung erfährt und, seitdem oft vorgenommen, in einer Anzahl von Fällen von Erfolg begleitet war, gelangte dieselbe erst in der neuesten Zeit zur allgemeinen, vollen Würdigung. Noch im Jahre 1875 war die damals von Fräntzel ausgesprochene Klage berechtigt, »dafs in den gebräuchlichsten und ausgezeichnetsten Handbüchern der Chirurgie als ausschließliche Indicationen für die Operation direkte Lebensgefahr durch bevorstehende Erstickung und drohenden oder bereits erfolgten Durchbruch eines Empyems nach ausen aufgestellt sei.«

Diefer nihilistische Standpunkt findet darin seine Erklärung, dafs zu Anfang der siebziger Jahre die Heilresultate bei der chirurgischen Behandlung des Pyothorax noch wenig erfreulich erschienen, da erst damals die Lister'schen Grundsätze der Antiseptik sich zu verbreiten begannen, und da ausserdem ein frühzeitiges Eingreifen bei der eitrigen Pleuritis dadurch verhindert wurde, dafs sichere Kriterien für die Diagnostik des Leidens nicht bekannt waren. Bis dahin schlofs man nach Constatirung eines Pleuraexsudates auf dessen purulente Beschaffenheit, wenn das im Verlauf des pathologischen Processes auftretende Fieber über den gewöhnlichen Termin hinaus fortbestand, gleichzeitig der Ergufs keine Verringerung seines Niveaus zeigte und sich Oedem der Thoraxhaut auf der erkrankten Seite manifestirte.

Keines dieser Symptome indeffen repräsentirt ein zuverlässiges Unterscheidungsmerkmal. Nicht selten machen sich anhaltende Temperatursteigerungen bei Vorhandensein eines serös-fibrinösen Exsudates als Ausdruck einer schleichenden Fortdauer des Entzündungsvorgangs oder einer in Folge der Pleuritis entstandenen event. dieser als Ursprung dienenden Phthisis geltend. Andererseits kommen nach den Beobachtungen von Ewald eitrige Ergüsse vor, welche keinerlei Erhöhung der Körpertemperatur hervorrufen, andere, welche mit intermittirendem Fieber einhergehen; am häufigsten allerdings ist das Leiden von hohem continuirlichen Fieber begleitet. Ebenso liefert die Stabilität oder das fortgesetzte Anwachsen des Exsudates keinen Anhaltspunkt für dessen Beschaffenheit, und die erwähnte Betheiligung der Thoraxwand gefällt sich zu allen Pleuritiden von bedeutender Ausdehnung.

Ein unbedingt zuverlässiges Resultat betreffs der Natur eines Ergusses liefert allein die Probepunction, welche, falls sie vorsichtig ausgeführt wird, auch mit keiner Gefahr für den Patienten verbunden ist. Die einzigen Cautelen, welche man zu treffen hat, bestehen darin, daß man zuvor die zu benutzende Pravaz'sche Spritze auf luftdichten Verschluss prüft und sorgfältig desinficirt, dann unter Verschiebung der Haut entfernt vom unteren Rippenrand rasch im Intercoostalraum in gehöriger Tiefe einsticht und unter genauer Fixirung der Kanäle langsam den Stempel in die Höhe zieht. Es empfiehlt sich ferner, an der tiefsten Stelle der Dämpfungszone zu aspiriren, damit man auch im Beginn der Eiterproduction, wo die specifisch schwereren Eiterkörperchen sich zu Boden senken und so die Trennung in eine seröse obere und eine zellenreiche untere Schicht bewirken, ein untrügliches Ergebniss erhält.

Noch nicht hinreichend allgemein gewürdigt erscheint mir ein weiterer Vorzug der Probepunction, welcher darin liegt,

dafs sie über das Bestehen und die Dimensionen von Pleura-schwarten besser als alle anderen Methoden Aufschlufs erteilt.

Aufserdem ebnet sie der mikroskopischen Untersuchung die Bahnen und ermöglicht so, früh manche deletären Vorgänge zu eruiren, welche auf andere Weise erst spät zu unserer Kenntnifs gelangen würden. Namentlich gilt dies, wie wir nur beispielsweise erwähnen wollen, für die Constatirung einer versteckten Phthisis durch Nachweis von Tuberkelbacillen.

Die Probepunction influirt die chirurgische Behandlung des Empyems in doppelter Beziehung: sie gibt stets eine Directive für den geeigneten Zeitpunkt des Eingreifens und bisweilen, wie wir später sehen werden, für den Modus desselben.

Die dauernde Beseitigung eitriger Pleuraergüsse wird entweder durch Punction des Thorax unter Abschlufs des Luftzutritts oder durch die Eröffnung der Pleurahöhle mittelst Incision erstrebt.

Da die früher vielfach angewandten Troicarts nach Reybard, Trouffseau, Schuh u. A. nur insoweit eine Entleerung des Secretes herbeiführen können, als augenblicklich die ausgedehnten Thoraxwände und die verdrängten Eingeweide sich ihrer ursprünglichen Lage zu nähern, und die comprimierten Partien der Lunge sich auszudehnen vermögen, — welche Eigenschaften nahezu immer bei der Anwesenheit von Pleuraergüssen mehr oder weniger beeinträchtigt sind, — so hat man gegenwärtig wohl allgemein die Anwendung jener Instrumente aufgegeben und bedient sich lediglich der Aspirationsapparate und der Hebervorrichtungen.

Erstere bestehen entweder aus Recipienten, in welchen mittelst einer Saugpumpe ein luftverdünnter Raum erzeugt wird, oder aus Spritzen; sie sind theils mit einem verschließbaren Troicart, theils mit einer Hohlnadel verbunden.

Indem wir uns einer ausführlichen Beschreibung der so weit verbreiteten und in vielen Modificationen existirenden Saugapparate enthalten, wollen wir es nicht unterlassen, die Ein-

wände, welche vielfach gegen das Aspirationsverfahren geltend gemacht werden, einer kurzen Besprechung zu unterziehen.

Loffen geht in seiner Bearbeitung von Hüter's Grundriss der Chirurgie so weit, jene Methode völlig zu verwerfen, weil die Aspiration zum Bersten pleuraler Blutgefäße und zu Blutungen in die Pleurahöhle führen könne.

Dagegen ist anzuführen, daß wenn man den intrathoracischen Druck mittelst des Apparates nicht allzu jäh herabsetzt, nur Quantitäten von 1000—1200 ccm durch eine nicht zu weite Canüle entnimmt und sich durch plötzlich eintretende Dyspnoe oder heftige Hustenparoxysmen, die Kriterien für eine genügende Entlastung der Lunge, zum Sistiren der Operation bestimmen läßt, man erfahrungsgemäß weder Rupturen der Gefäßwände noch Zerreißen des Lungenparenchyms zu gewärtigen hat. Todesfälle durch plötzlich eintretende Gehirn-anämie sind dadurch zu vermeiden, daß der Patient während der Aspiration in Rückenlage zubringt und von Zeit zu Zeit Analeptica erhält.

Ist die Stelle der Punction nicht durch das Bestehen einer Abkapselung bedingt, so wird man am besten, um eine Verletzung des Zwerchfelles auszuschließen, in der Mitte zwischen vorderer und hinterer Axillarlinie rechts im 4. oder 5., links im 6. oder 7. Intercostalraum einstechen oder an der Rückenwand unter der 8. oder 9. Rippe. — Die Klagen über artificiell erzeugte Umwandlung eines eitrigen Ergusses in einen putriden verstummen, seitdem man sich gewöhnt hat, sich eines aseptischen Instrumentariums zu bedienen und die Haut des Patienten in der Gegend der Punktionsstelle sorgfältig zu reinigen.

Ein Vorwurf, den man gerechtfertigter Weise der Aspirationsmethode machen kann, ist der, daß die bei derselben verwandten Apparate einen höheren negativen Druck ausüben als nothwendig ist, wie H. Smidt überzeugend nachweist. Nach Leyden's manometrischen Bestimmungen ist der

höchste zu überwindende Zug, welcher von Seiten der Brustorgane auf das Exsudat ausgeübt wird, gleich — 42 mm Quecksilber. Smidt constatirt nun, daß ein mäßiges Anziehen des Stempels der Dieulafoi'schen Saugspritze schon einen negativen Druck von 100—200 mm Quecksilber erzeugt, daß dagegen im Potain'schen Apparat bei vorsichtigem Gebrauch ein Minusdruck von 300 mm bis 400 mm Quecksilber herrscht. Naturgemäß finden demnach, während das Exsudat sich in den Aspirationsapparat ergießt, äußerst erhebliche Druckschwankungen statt.

Diese Uebelstände sind bei Benutzung einer Hebevorrichtung mit Sicherheit zu vermeiden. Da das Quecksilber 13,5 mal schwerer als Wasser ist, so genügt es zur Entleerung des Exsudates, das ja im extremsten Fall unter einem negativen Druck von 42 mm Quecksilber steht, wenn man eine Wasserfäule, deren unteres Ende etwas tiefer als $42 \cdot 13,5 \text{ mm} = 567 \text{ mm}$ unter das Niveau des zu aspirirenden Ergusses reicht, mit diesem in Contact bringt.

Die durch Ewald, Fiedler, Riefel, Goldammer und Smidt empfohlene Hebermethode ist einfach, unschädlich und außerordentlich leicht ausführbar. Sie besteht darin, daß man eine Hohnadel mit weitem Lumen, welche durch einen langen Gummischlauch mit einer antiseptischen Flüssigkeit enthaltenden Irrigator in Verbindung steht, an geeigneter Stelle in die Pleurahöhle des im Bett liegenden Patienten einführt und darauf unter Festhalten der Canüle das Blechgefäß des Irrigators auf den Fußboden stellt. Der Niveauunterschied beträgt erfahrungsgemäß unter diesen Umständen gewöhnlich etwa 1 Meter und ist völlig ausreichend, um ein gleichmäßiges, schnelles Abfließen des Exsudates hervorzurufen. Sollte sich die Punctionsnadel verstopfen, so beseitigt man das Hemmnis leicht, indem man durch Emporheben des Apparates einen positiven Druck erzeugt und so etwas Flüssigkeit zurücktreibt.

In Anbetracht des geringen und gleichmäßigen Zuges,

welcher durch den Heber bewirkt wird, wagte es Fiedler, Secretmengen bis zu 4500 ccm auf einmal zu entleeren, ohne jemals irgend welche Nachtheile dabei zu beobachten.

Die Frage, ob die Punction der Pleurahöhle beim Empyem indicirt sei, wird von vielen Autoren unbedingt negirt.

Albert (Lehrbuch der Chirurgie 2. Bd. 2. Aufl. pag. 238) bemerkt in dieser Beziehung:

„Da die spontane Heilung des eitrigen Ergusses nicht erfolgt, der spontane Durchbruch in die Bronchien Erstickung herbeiführt, der spontane Aufbruch nach aussen aber der künstlichen Eröffnung an Gefahr gleich kommt, andererseits aber die Eröffnung wirklich Heilungsergebnisse herbeiführt, so ist schon das Vorhandensein des eitrigen Ergusses, auch wenn er nicht durchzubrechen droht, auch wenn er nicht Erstickungsgefahr bedingt, eine Indication zur Radicaloperation.“

Dieses Urtheil enthält verschiedene Irrthümer.

Die spontane Resorption des Empyems wurde bei Kindern wiederholt beobachtet, und Baelz theilt den höchst interessanten Fall eines 23jährigen Mannes mit, bei welchem ein aus einem Pyopneumothorax nach Schluß der Lungenfistel restirendes Empyem ohne jeden Eingriff zur Aufsaugung kam.

Ergießt sich ein eitriges Exsudat direct in einen freigelegten Bronchus, so tritt nach diesem Ereigniss nicht stets Suffocation ein. Ueberdies erfolgt nach Traube die Elimination des Ergusses durch die Lunge meistens in anderer Weise. Es wird nämlich nach Necrotisirung der Pleura pulmonalis die eitrige Flüssigkeit während des Hustens durch das feinmaschige Pulmonalgewebe allmählich in die Bronchien filtrirt und von da aus expectorirt. So kommen, feltener bei Erwachsenen, ziemlich häufig jedoch bei kleinen Kindern völlige Naturheilungen zu Stande. Baginsky empfiehlt aus diesem Grunde geradezu, gegenüber dem Empyem von Individuen im frühesten Kindesalter für einige Zeit expectatives Verhalten zu beobachten.

Unzweifelhaft sind durch Punctionen mit nachfolgender Aspiration unter gewissen Verhältnissen eitrige Pleuritiden heilbar. Baginsky stellte durch dieses Verfahren zwei Patienten im Alter von 9 — 10 Monaten und 3 Jahren wieder her; Senator beobachtete Genesung bei 3 Kindern; Baelz und Waldenburg bewirkten durch einmalige Punction und Aspiration bei einem 7- respective 15-jährigen Mädchen schnelle Rückkehr zur Norm; Fiedler erwähnt, daß er bei dem Empyem der Kinder mit der einfachen Punction öfter günstige Resultate erlangt habe, und daß dieselbe auch bei Erwachsenen bisweilen zum Ziel führe.

Die meisten Erfahrungen sprechen gegen die Methode. In der Regel erfüllt sie selbst bei frühzeitig erfolgreichem Eingriff nicht ihre Aufgabe, durch eine theilweise Entfernung des Eiters die Resorption des Restes anzuregen. Unbedingt machtlos zeigt sie sich bei chronischem Empyem, wo auf der Pleura aufsitzende dicke membranöse Auflagerungen nicht nur die Aufsaugung erschweren, sondern zugleich zu neuer Eiterproduction Anlaß geben. Fritz macht ferner darauf aufmerksam, daß wiederholte Punctionen bisweilen die Entstehung abgeackter Eiterherde verursachen, die wegen ihres Sitzes oder ihres zahlreichen Vorhandenseins später keiner Behandlung zugänglich sind.

Ein Verfahren, welches den Zweck verfolgt, unter Luftabschluß eine möglichst vollständige Entfernung des Eiters hervorzubringen und denselben durch ein geringeres Quantum einer leicht resorbirbaren Flüssigkeit zu substituieren, wurde 1880 von Baelz in die Praxis eingeführt. Er läßt durch einen Troicart 500—1000 ccm Secret aus der Pleurahöhle ablaufen und darauf solange eine Thymollösung einfließen, bis der Abfluß stockt. Der so verdünnte Eiterrest wird dann wieder entleert und wieder durch die antiseptische Lösung ersetzt. Dieser Proceß wird so lange wiederholt, bis keine Trübung des Thymolwassers mehr nachweisbar ist.

Nachdem Kaschimura bei 3 Japanesen im Alter von 13—21 Jahren Genesung durch die Baelz'sche Methode erzielte, wurde dieselbe vielfach geprüft und führte ebenso wie die einfache Punction in vereinzeltten Fällen bei Kindern zur Heilung, in den meisten ergab sich auch hier ein negatives Resultat. Goldammer gelang bei einer 42 jährigen Frau durch einmalige Anwendung der mit Auspülung verbundenen Punction die völlige Beseitigung eines seit etwa vier Wochen bestehenden mittelgroßen eitrigen Exsudates, während er bei frischen Empyemen zweier Männer von 20 und 30 Jahren nach vergeblichen Versuchen mit jener Operationsmethode sich zum Radicalschnitt zu entschließen gezwungen sah. Ähnliche Misserfolge werden zahlreich berichtet.

In der That wird auch bei Erwachsenen nur äußerst selten das vorliegende Verfahren ebenso wie die bloße Punction eine restitutio in integrum ermöglichen, da eine solche bei beiden Operationsarten durch eine schnell stattfindende totale Verklebung der beiden Pleurablätter bedingt ist. Diese kann indeß, — selbst wenn das Secret nicht mit festen Gerinnseln und compacten Pseudomembranstückchen untermischt ist, die einen Stillstand in der Eiterbildung nicht gestatten, und nicht ein starrer Empyemack sich bildete, — nur bei Kranken mit vorzüglicher Elasticität der Lunge und so hochgradiger Adaptationsfähigkeit des Thorax vor sich gehen, wie sie sich in Europa fast ausschließlich bei sehr jungen Individuen vorfindet, nach Wernich aber bei den Japanesen auch im mittleren Mannesalter zu den gewöhnlichen Vorkommnissen zählt. Unter jenen Verhältnissen vollends, welche unser Fall 3 illustriert, zu dem wenig Analogien in der Literatur verzeichnet sein dürften, kann der Eiterquell nur dann versiegen, wenn die Brustwandungen ein ganz besonders hervorragendes Anpassungsvermögen besitzen.

Die vom chirurgischen Standpunkt aus rationellste Behandlungsweise des Pyothorax ist, wie jeder zugestehen wird,

der sich zu Lister's Principien bekennt, diejenige, welche unter Verhütung der Sepsis dem Eiter durch eine weite Oeffnung in der Brustwand und genügende Drainirung des Cavum pleurae andauernden Abfluß verschafft: die gegenwärtig vorwiegend geübte Methode der Thoracotomie. Bei dieser gilt es, eine allmähliche Obliteration der Brusthöhle zu bewirken, welche dadurch zu Stande kommt, daß von der Pleura costalis einerseits und der Pleura pulmonalis andererseits Granulationen aufschießen, die vom Hilus aus mit einander zu verwachsen beginnen und sich contrahirend successive die Lunge zur Entfaltung bringen. Ein Aneinanderrücken der beiden Pleurablätter wird aber verhindert, wenn eine Stagnation von Eiter in der Brusthöhle stattfindet. Als erstes Postulat für die Operation ergibt sich also die Herstellung einer großen Oeffnung und einer hinreichenden Drainage.

Soll eine baldige Wiederherstellung erfolgen, so müssen die Thoraxwände der sich ausdehnenden Lunge dadurch entgegenkommen, daß das Zwerchfell in die Höhe steigt und eine Verkleinerung der Intercostralräume durch Zusammenrücken der Rippen eintritt. Je früher und intensiver diese Adaptation vor sich geht, desto schneller wird die Genesung herbeigeführt, vorausgesetzt daß dem Abfluß des Eiters ausgiebig Raum gewährt wird. Gerade in dieser Beziehung stellen sich nun im Verlauf der Nachbehandlung zumeist erhebliche Schwierigkeiten ein, wenn der Radicalschnitt bloß einen Intercostralraum eröffnete. Es wurde deshalb vielfach, um die Fistelöffnung wegsam zu erhalten, eine silberne Canüle in dieselbe eingelegt, was indeffen nicht zweckmäßig erscheint, weil dadurch das Einsinken des Brustkorbes — wenn auch nur in geringem Grade — erschwert wird.

Um beiden Anforderungen des Heilungsprocesses gerecht zu werden, geschieht in neuerer Zeit nach dem Vorgang von Roser, Baum und König von vornherein die Eröffnung des Pleuraraumes nach vorhergehender subperiostaler

partieller Rippenresection, wodurch denn auch in Wirklichkeit eine Verringerung des Brustumfanges vermittelt und der Eiterretention vorgebeugt wird. — Eine Deformität des Thorax refutirt aus der Excision des Rippenstückes um so weniger, als die Neubildung des Knochens von dem losgelösten Periost aus prompt erfolgt.

Es ergibt sich nun die Frage, wo wir die Incision machen sollen. Von vornherein zu verwerfen ist die von Fräntzel empfohlene Schnittführung im 5. Intercoostalraum zwischen Mamillar- und vorderer Axillarlinie, weil sie ein spontanes Abfließen des Eiters erschwert. Albert und Heineke eröffnen in der seitlichen Thoraxgegend parallel und nahe dem oberen Rand der 5. und 6. Rippe. König operirt jetzt vorwiegend in folgender Weise: Unter Beobachtung aller antiseptischen Cautelen schneidet er in der Axillarebene auf die 6. Rippe in der Richtung ihrer Längsaxe ein, durchtrennt so Haut und Muskulatur, entfernt nach Abhebelung des Periostes ein 5—6 cm langes Stück des Knochens und perforirt in gleicher Ausdehnung die Pleura. Nach möglichst vollständiger Entfernung des eitrigen Inhalts und nach genauer Ausführung einer antiseptischen Ausspülung des Pleuraraumes führt er schliesslich ein 5—6 cm langes kleinfingerdickes Drainrohr ein und umhüllt die Brust mit einem Lister'schen Verband. Eine Incision in der angegebenen Gegend hat den Vorzug vor einer unten nahe der Wirbelsäule angebrachten, dass keine umfangreichen Muskelschichten gespalten werden müssen, und ein Verlegen des kurzen Drainrohrs bei dem Hinaufsteigen des Zwerchfells nicht leicht stattfindet. Damit die Entleerung des Sekretes durch den Drain regelmässig von Statten geht, muss der Patient eine andauernde Lage auf der kranken Seite innehalten; zudem lässt König die an den abschüffigen Partien des Zwerchfells angesammelte Flüssigkeit mehrmals täglich dadurch beseitigen, dass durch Erheben des unteren Körpertheils die Wundöffnung während einiger Minuten zum tiefsten Punkt der leidenden Brusthälfte gemacht wird.

Contraaperturen sind unbedingt erforderlich nach Spaltung einer ungünstig gelegenen Fistel oder bei der Existenz mehrerer Abfackungen; für wünschenswerth erachte ich sie um die Infectionskeime putrider Ergüsse mittelst antiseptischer Flüssigkeiten möglichst schnell fortzuschwemmen zu können. v. Nussbaum erblickt einen enormen Vortheil der Contrapunctionen darin, „dafs Flüssigkeit aus einem Fasse, wie es die Pleurahöhle vorstelle, sehr schnell und gut auslaufe, wenn 2 Oeffnungen beständen, aber wegen des mangelnden Luftdrucks sehr langsam, wenn nur eine Oeffnung vorhanden sei.“

Uebersaus einfach gestaltet sich bei der Operation nach Königs Methode die Nachbehandlung. Während bei dem bis vor Kurzem herrschenden Incisionsverfahren sich öfter Eiteranstauung durch Ansteigen der Temperatur und gestörtes Allgemeinbefinden kund gab, trotzdem täglich 1—2 Mal die scrupulösesten Auswaschungen der Brusthöhle vorgenommen wurden, genügt hier in allen aseptisch zur Behandlung gelangenden Fällen die Drainage, um den stets geruchlosen Eiter in den Lister'schen Verband überzuführen, der hier — wie gewöhnlich — vorzüglich seine Bestimmung erfüllt.

Unter diesen Umständen ist eine Beschleunigung des Heilungsprocesses unausbleiblich, denn gewifs werden durch das Ausspülen vielfach die neugebildeten Adhäsionen zerstört.

Bei Putrescenz des Secretes ist selbstverständlich eine sorgfältige Desinfection geboten, und König bewerkstelligt sie in der Weise, dafs er zunächst mit Salicylsäurelösung den übelriechenden Eiter fort schafft und darauf die Pleurahöhle mit einer Chlorzinksolution (1:15 und 1:30) irrigirt. Das Mittel bewährte sich vorzüglich, während die früher zu gleichem Zweck verwandte Carbolsäure zahlreiche Intoxicationen hervorrief.

So evident nun die Vortheile des nach Königs Vorschrift ausgeführten Heilverfahrens sind, so vermag doch eine einmalige primäre Rippenresection manchmal nicht die Ob-

literation der Pleurahöhle zuwegezubringen. Nach einer gewissen Dauer des Fortschreitens des Heilungsprocesses ist ein merkbarer Stillstand eingetreten, sei es dafs die lange Zeit comprimirt gewesene Lunge in Folge narbiger Schrumpfung eine erhebliche Verminderung ihrer Ausdehnungsfähigkeit erlitt, sei es dafs die Thoraxwand wegen eingetretener Erschöpfung ihrer Elasticität oder wegen von vornherein vermehrter Resistenz sich nicht hinreichend adaptirt. Die Eitrung bleibt copiös, der Hohlraum verkleinert sich nicht. In solchen Fällen mufs man an jener Partie, welche zurückbleibt, durch Excision eines oder mehrerer Rippenstücke den horizontalen Durchmesser des Thoraxraumes zu verkleinern suchen. Zuerst von Heineke empfohlen, wurde diese Operationsart durch Eftlander weiter ausgebildet und führte in zwei von acht durch Homén veröffentlichten Fällen zur Genesung.

Gehen wir nun dazu über, die Anzeigen für die verschiedenen besprochenen Behandlungsweisen des Empyems festzustellen, so müssen wir zunächst erklären, dafs aufser der Thoracotomie, der „Radicaloperation“, keine Methode existirt, welche uns jemals von vornherein die Wiederherstellung des Erkrankten zu gewährleisten im Stande ist. Dennoch würden wir auf Grund der beobachteten Heilresultate bei Pleuritiden, welche ohne Complication auftreten, und deren Exsudat erst vor Kurzem die Umwandlung aus dem sero-fibrinösen in den eitrigen Zustand erfuhr, einen einmaligen Versuch mit einfacher Punction mittelst der Hebevorrichtung oder einen solchen nach dem Baelz'schen Verfahren anempfehlen, doch würden wir rathen, wenn der Ergufs darauf wieder zunimmt, oder die Temperatur andauernd die Norm überschreitet, sei es dafs sie nach der Paracenthese nicht abfällt oder bald wieder ansteigt, unverzüglich die Incision der Pleura auszuführen, um nicht die für die Entfaltung der Lunge werthvollste Zeit unbenutzt vorübergehn zu lassen. Ausserdem erscheint bei Fällen mit lebensgefährlichen Complicationen, wo lediglich eine kurze

Verlängerung des Daseins für den Kranken zu erringen ist, die Punction mit nachfolgender Ausspülung zweckentsprechend. Ebenso ist sie zu bevorzugen bei purulenten Ergüssen, welche sich im Anschluß an chronische Lungenaffectionen bilden, zumal die verschiedensten Beobachter mit Einhelligkeit constatiren, daß derartige Lungenleiden gewöhnlich nach der Radicaloperation des Pyothorax rapide Fortschritte machen und zu baldigem Tode durch Tuberculose führen. Indessen nehmen wir das putride Empyem, auch falls es einer in die Pleura durchgebrochenen phthisischen Caverne seine Entstehung verdankt, für die Thoracotomie in Anspruch, da unserer Ueberzeugung nach allein eine ausgiebige Desinfection und gründliche Drainage den Fäulnißherd beseitigen kann, und das Fortbestehen der Putrescenz den Organismus mehr gefährdet als jener operative Eingriff. Puky gelang es in einem derartigen (in Langenbeck's Archiv für Chirurgie publicirten) Fall ein glänzendes Resultat zu erzielen, indem er durch eine mit Rippenresection verbundene Thoracocision, an welche sich Ausspülungen mit Chlorzinklösung und exacte Drainirung reihten, nicht nur die Sepsis und die Eiterbildung lahm legte, sondern auch einen Schluß der Lungenfistel und selbst Resorption der im Thorax verbliebenen Luft erreichte.

Ist so für Fäulnißkeime enthaltende Exsudate die Thoracotomie die allein wirksame Operationsmethode, so übertrifft sie, wenn wir von jenen oben statuirten Ausnahmen absehen, auch bei den rein eitrigen Ergüssen alle übrigen Verfahren bei Weitem an Erfolg.

Die günstigste Prognose bietet sie bei Empyemen, welche sich an acute Infectionskrankheiten anschließen, speciell kann man jungen kräftigen Individuen, wenn bei ihnen nach Ablauf einer croupösen Pneumonie sich ein Pyothorax entwickelt, und derselbe rechtzeitig dem Brustschnitt zugänglich gemacht wird, beinahe mit Sicherheit Genesung in Aussicht stellen.

Einen auffallend glücklichen Ausgang ferner gewinnen

nicht selten durch die Thoracotomie eitrige Pleuritiden, welche durch einen peripher gelegenen gangränösen Herd in der Lunge inducirt werden: von 6 Fällen dieser Art, die von 1877—1879 in der propädeutischen Universitätsklinik zu Berlin in der angegebenen Weise behandelt wurden, endete nur ein einziger letal, alle übrigen, — darunter sogar 2, bei denen der Brandherd durch Metastasen im Verlauf schwerer Infectiouskrankheiten (Puerperalfieber und Typhus) entstanden war, — gelangten zu baldiger Heilung.

Geringe Chancen scheint die Incision nach den darüber veröffentlichten Beobachtungen bei jener kleinen Kategorie von Empyemen darzubieten, welche aus einer primären Pleuritis hervorgehen, doch ist das bisher beigebrachte Material zu einer ficheren Entscheidung dieser Frage wohl noch nicht ausreichend. —

Diefer kurzen Betrachtung erlaube ich mir die Mitteilung der Behandlung und des Verlaufes von drei einschlägigen Fällen anzureihen, welche auf der I. Internisten-Station des Gar-nisonlazareths zu Oberwiesefeld von Herrn Stabsarzt Dr. Solbrig behandelt wurden. Derselbe hatte die Güte, mir obige Fälle zur Publication zu überlassen, wofür ich ihm meinen aufrichtigsten Dank ausspreche.

1) S., 21 Jahre alt, wurde am 12. 2. 84 aufgenommen. Die Eltern des Patienten erfreuen sich guter Gesundheit, auch er selbst will bisher nie erkrankt gewesen sein. Am 10. 2. begann sein Leiden mit einem Schüttelfrost, Husten mit blutigem Auswurf, Stechen auf der linken Thoraxseite, dessen Intensität sich bei tiefer Inspiration, namentlich bei forcirter Expiration (Husten) steigerte, Durst, Appetitmangel, Schlaflosigkeit.

Status praesens am 12. 2. 84 Nachm. Patient von kräftiger Körperconstitution, Musculatur und Panniculus adiposus gut entwickelt. Puls regelmäfsig, voll, gespannt, 112 Schläge in der Minute. Temperatur 40,5° C. Respiration beschleunigt,

32 Athemzüge in der Minute; Nasenflügelathmen. Husten intensiv, expectorirt zähe rothfarbene Sputa. Wangen hoch geröthet. Zunge mäsig belegt, feucht. Herpes labialis nicht vorhanden. Harn eiweißfrei, specif. Gew. 1022. Percussionschall über der Lunge l. h. u. abgeschwächt. Dasselbst ver schwächtes Athmen und Knisterrasseln, an einer circumscripten Stelle bronchiales Athmungsgeräusch; rechte Lunge normal. Herzdämpfung normal, Herztöne rein.

Ordnation: Bäder von 12—15° R. so oft (bei zweistündlichen Messungen) die Temperatur des Körpers 39° übersteigt. Wein als Analepticum.

Nachdem sich bei Fortbestehen der Schmerzen, des Hustens, der pathognostischen Sputa und der Dyspnoe die objectiven Symptome einer croupösen Pneumonie (gedämpfter Percussionschall, Bronchialathmen, vermehrter Stimmfremitus), wie sie für das Hepatisationsstadium dieser Krankheit charakteristisch sind, sich im Bereich des linken Unterlappens am 13. und 14. Februar bestimmt manifestirten, gefellte sich am 15. pleuritiches Reibegeräusch hinzu, welches am deutlichsten in der linken Achselhöhle wahrnehmbar war. — Das Fieber betrug bei leicht remittirendem Typus in Tagesmaximum trotz angewandter Antipyrese an diesen drei Tagen 40,2°, 40°, 40,2°, im Mittel 39,2°, 39,2°, 39,1°. Pulsfrequenz fortgesetzt hoch (112–120 pro Minute). Harn frei von Eiweiß.

Nunmehr entwickelte sich sehr rapide eine Pleuritis exsudativa. Während der Puls frequent blieb, das Fieber nicht zum Abfall gelangte, ergab die Percussion bereits am 17. 2. über der von der Spina scapulae nach abwärts gelegenen hinteren Partie des Thorax absoluten Mauerton. Der Pectoralfremitus erschien daselbst abgeschwächt, das Respirationsgeräusch leise und bronchial. Eine am 18. 2. vorgenommene Probepunction förderte eitriges Secret zu Tage.

Am 20. 2. war der Status folgender: Absolute Dämpfung in der linken Mammillarlinie bis zur Mitte des 3. Intercostal-

raums sowie hinten bis oberhalb der Spina scapulae, vorn über und unter der Clavicula tympanitischer Schall. Stimmvibration und Athmungsgeräusch erscheinen innerhalb dieses Bezirkes der leeren Percussion an der vorderen linken Brusthälfte schwach, an den hinten gelegenen Partien der linken Thoraxseite völlig aufgehoben. Herzverlagerung ihrer Begrenzung nach nicht deutlich nachweisbar, die Herztöne aber rechts vom Sternum besonders laut. Die linke Thoraxhälfte bleibt bei der Inspiration an Ausdehnung bedeutend hinter der rechten zurück.

Wegen des jähen Ansteigens des Exsudates und des eitrigen Charakters desselben wurde jetzt die Thoracotomie vorgenommen.

Nachdem Patient in Chloroformnarcose versetzt und das Operationsfeld aseptisch gemacht war, wurde unter Lister'schen Cautelen in der linken Axillarlinie die Haut im 5. Intercostalraum mittelst eines 8 cm langen Schnittes durchtrennt, darauf in gleicher Ausdehnung schichtenweise die Musculatur nahe dem oberen Rande der 6. Rippe auseinandergelegt und nach Stillung der mäßigen Blutung die Pleura costalis gespalten. Um eine zu plötzliche Aenderung des intrathoracischen Druckes zu verhindern, erschien es angezeigt, von Zeit zu Zeit während des Ausströmens des Exsudates die Oeffnung zu verschließen. Es entleerten sich mehrere Liter purulenter, mit Flocken und pseudomembranösen Fetzen untermischter Flüssigkeit. Als der Ausfluß cessirte, fand eine ausgiebige Ausspülung der Thoraxhöhle mit 3,5% iger Bor säurelösung statt, welche zuvor auf 37,5° C. erwärmt worden war. Dann wurden 2 dicke Drainrohre von verschiedener Länge eingeführt und mittelst Fadenenden befestigt. Lister'scher Verband.

Unmittelbar nach der Operation, welche ohne jede Störung verlief, fiel die Temperatur zur Norm ab und das Allgemeinbefinden des Kranken war durchaus befriedigend. Die Nachbehandlung bestand neben Darreichung einer roborirenden Diät darin, daß täglich die Pleurahöhle mit einer 3,5% 0

Boräurelösung von $37,5^{\circ}$ C. so lange irrigirt wurde, bis die Flüssigkeit völlig klar abfloss. Membranstücke und grössere Flocken wurden, insoweit nicht Hustenstöße oder die eingegossene Flüssigkeit sie aus der Incisionsöffnung trieben, meistens durch eine Spritze aspirirt oder, wenn sie mit der Pincette erreichbar waren, durch diese entfernt. Die sorgfältig vorgenommenen Auspülungen und constant angewandten antiseptischen Verbände, vermochten nicht zu verhindern, daß wiederholt die Temperatur sich bis zu 39° erhob, doch gestaltete sich der Gesamtverlauf nicht ungünstig. Appetit, Darmfunctionen, Harnsecretion waren durchgehend normal. Die Herzaction kräftigte sich bald, die Pulsfrequenz sank schon am 23. 2. auf 84 pro Minute. Das Körpergewicht, welches am 16. 2. 64 kg betrug, bis zum 23. 2. auf 59 kg sich reducirte, nahm von da ab stetig zu: bis zum 8. 3. stieg es auf 61 kg, von da bis zum 15. 3. auf 62 kg; am 28. 4. hatte es wieder die Höhe von 64 kg erreicht.

Auch der lokale Proceß zeigte eine befriedigend fortschreitende Besserung. Vom 15. März ab bereits war die Eiterproduction so gering, daß ein jeden zweiten Tag vorgenommener Wechsel des Verbandes genügte; im weiteren Verlauf geschah die Erneuerung in immer größeren Intervallen. — Mehr und mehr entfaltete sich die zuvor comprimirt Lunge und das Herz trat an seine Stelle zurück. Schon am 12. 3. konnten die Drains zum ersten Mal gekürzt werden. Der sondirende Catheter, vorsichtig vorgeschoben, drang damals im Maximum noch bis auf 15 cm — nach hinten oben — vor, liefs sich jedoch daselbst nicht zur Seite bewegen. Am 9. 5. hatte der Wundcanal eine Länge von etwa 6 cm, am 14. 5. liefs sich eine dünne Bongie in einer Ausdehnung von 5 cm einführen. Nun wurde die Drainage beseitigt, und am 19. 5. war die Fistel geschlossen.

Die Untersuchung des Patienten bei seiner am 20. 6. erfolgten Entlassung ergab von Seiten des normal gelagerten

Herzens keinen pathologischen Befund. Die linke Thoraxhälfte, vorn seitlich etwas eingedrückt, nach hinten leicht vorgewölbt, zeigte ein mäßiges Rétrécissement, demgemäß war eine mit der Convexität nach rechts gerichtete wenig erhebliche Scoliose der Brustwirbelsäule zu constatiren. Der Percussionschall war links hinten bis zu einer nahezu horizontalen Linie, welche von der Mitte des Proc. spin. vert. thor. VII. zur Narbe gezogen gedacht wird, leicht gedämpft, das Athmungsgeräusch in diesem Bezirk abgeschwächt vesiculär. —

Der folgende Fall verlief anfangs dem vorigen analog, weshalb ich mich einer eingehenden Schilderung des Initialstadiums enthalte.

2. F., 22 Jahre alt, von kräftiger Körperconstitution, hereditär nicht belastet und bisher stets gesund, erkrankte am 12. 2. 84. an einer Pneumonie des linken Unterlappens. Dieselbe war von hohem Fieber begleitet, das am 15. 2., wo die Aufnahme des Patienten erfolgte, und an den nächsten fünf Tagen trotz Einleitung einer antipyretischen Behandlung (Bäder wie oben), Maxima von 40° — $40,4^{\circ}$ neben Remissionen auf 39° — $39,2^{\circ}$ zeigte.

Am 15. und 16. 2. war Albuminurie vorhanden, während später der Harn stets frei von Eiweiß blieb.

Am 6. Krankheitstage stellte sich in der linken Seite pleuritisches Reibegeräusch ein. Den 22. Februar war der Befund folgender:

Gesichtsfarbe bleich. Zunge feucht und wenig belegt. Puls voll und weich, 92 Schläge in der Minute. Respirationen oberflächlich, beschleunigt, 26 pro Minute. Auf der linken Thoraxhälfte zwischen der hinteren Axillarlinie und der Wirbelsäule von der Scapula abwärts absolut leerer Percussionschall, abgeschwächtes Bronchialathmen und fast aufgehobener Pectoralfremitus; links vorn und seitlich heller Klopftön mit tympanitischem Beiklang sowie vesiculäres Athmungsgeräusch; in der Axillargegend pleuritisches Reiben; der Traube'sche

Raum nicht verkleinert. Herz normal gelagert, Percussionsfigur normal, Herztöne rein. Appetit gering. Stechende Schmerzen in der linken Seite.

Es wurde nun die Diagnose eines abgefackten Pleuraexsudates gestellt, welche durch die Ergebnisse wiederholter Probepunctionen bestätigt wurde; dieselben verliefen nämlich in der vorderen und mittleren Axillargegend völlig resultatlos, dagegen entnahmen sie in der hinteren Axillar- und Scapularlinie eine seröse Flüssigkeit. Bald darauf pflanzte sich der entzündliche Proceß auf das Pericardium fort. Am 28. 2. erstreckte sich, nachdem in der letzten Nacht sich die Dyspnoe erheblich gesteigert hatte, die pericardiale Dämpfung nach oben bis zur 2. Rippe, nach links über die Mammillarlinie hinaus, nach rechts bis zum rechten Sternalrand. Sowohl bei der Systole als bei der Diastole war an der Basis des Herzens ein schabendes Geräusch zu hören. Der Spitzenstoß erschien wellenartig und schwach, der Puls klein, weich, frequent. — Während nun bereits am 4. März die Resorption des Pericardialergusses sich einleitete, blieb das Pleuraexsudat völlig stationär.

Das Fieber persistirte vom 21.—24. 2. mit gleichen Exacerbationen wie zuvor, dagegen wurden die Morgenremissionen bedeutender, und nach einer am 23. Abends gereichten großen Chinindosis fand am folgenden Morgen ein 6 stündiger Abfall zur Norm statt. An den folgenden 4 Tagen sanken die Maxima auf $39,2^{\circ}$ — $39,5^{\circ}$, während die Minima 38° — $38,2^{\circ}$ betrugen. — Vom 29. März bis zum 4. Mai stieg die Temperatur wieder zu Tageshöhen von 40° — $40,2^{\circ}$ bei Morgenremissionen von etwa 1,5.

Unter diesen Verhältnissen nahmen die Kräfte des Patienten in Beforgniß erregender Weise ab. Die physikalische Untersuchung ergab am 4. 5., daß das Niveau des Exsudates seit dem 22. 2. unverändert geblieben war; eine erneut vorgenommene Probepunction bewies die Umwandlung des Ergusses in ein Empyem.

Daher wurde am 5. 3. die Radicaloperation vorgenommen.

Unter Chloroformnarkose und antiseptischen Vorkehrungen wurde unterhalb des Scapularwinkels auf die 8. Rippe bis auf das Periost eingeschnitten, daselbe mit dem Elevatorium abgehoben, ein 4 cm langes Stück des Knochens reseziert, und da eine erhebliche Blutung nicht eintrat, sogleich die stark verdickte Pleura durchtrennt. Es erfolgte der Ausfluß eines dicken purulenten Secretes, das ringsum eingekapselt war. Ausspülungen, Drainage, Verband wurden genau nach demselben Modus wie bei dem vorigen Fall ausgeführt.

Die Temperatur fiel am Tage der Operation zur Norm ab und verharrte auf derselben während des ganzen Heilungsprocesses. Patient zeigte unmittelbar nach dem chirurgischen Eingriff und auch im ganzen weiteren Verlauf stets subjectives Wohlbefinden. Die Resorption des Pericardialergusses nahm ungestörten Fortgang, und am 15. 3. ergab die physikalische Untersuchung des Herzens keinerlei pathologische Resultate mehr. Eine Anstauung des Secretes war bei der günstigen Lage und der Gröfse der Oeffnung, welche die Einlegung sehr dicker Drains erlaubte, kaum möglich; sehr selten nur fand sich bei den Ausspülungen eine minimale Menge Eiters in der Pleurahöhle, in der Regel lief die hineingeleitete Flüssigkeit völlig hell und klar ab. Die Verbände, anfangs schnell imbibirt, bedurften bei der rasch abnehmenden Eitersecretion schon bald nur eines einmalig täglichen Wechsels, schon vom 11. 3. an nur einer jeden dritten Tag, später einer immer feltener wiederkehrenden Erneuerung. Dementsprechend nahm auch die Annäherung der Pleura pulmonalis an die Pleura costalis einen erfreulichen Fortgang. Am 23. 4. erfolgte der völlige Verschluss der Fistel; nur restirte an der Thoraxwand eine kraterförmige Einsenkung mit üppigen Granulationen, welche unter Lapis-Aetzungen in kurzer Zeit sich in eine schöne, etwas vertiefte Narbe verwandelten.

Obgleich sein Appetit seit der Operation befriedigend war,

bewirkte die dem Patienten verordnete kräftige Kost geraume Zeit keine Zunahme des Körpergewichts. Daselbe betrug bei dem Eintritt des Kranken in das Lazareth 64 Kilogr., am 8. 3. 59 Ko. und blieb auf dieser Höhe bis zum 14. 3. Um diese Zeit steigerte sich das Nahrungsbedürfnis des Mannes in enormem Grade, und eine vierzehn Tage später vorgenommene Wägung ergab ein Plus von 10 Kilogr.

Vorzüglich gekräftigt verlief F. am 24. 6. das Lazareth. Kaum bemerkbar blieb die linke Thoraxhälfte hinter der rechten zurück. Der Umfang der letzteren differirte, bei tiefer Expiration vom proc. ensiformis bis zum proc. spin. vert. thor. X. gemessen, gegen den der linken Seite um 1 cm (44,5 gegen 43,5), so daß das Vorhandensein einer Deviation der Wirbelsäule (Scoliose nach rechts) nur bei genauester Inspection in's Auge fiel. Abwärts von einer Linie, die sich in leichtem Bogen vom Ende des proc. spin. vert. thorac. VII. über die Narbe hinaus bis zur linken hinteren Axillarlinie erstreckte, machte sich Schwartendämpfung und abgeschwächtes Vesiculärathmen geltend, während betreffs der übrigen Lunge, sowie des Herzens, die physikalische Untersuchung normale Resultate feststellte. —

Den dritten Fall bedauere ich wegen Mangel an genauen Daten nur kurz schildern zu können.

3. F., 22 Jahre alt, ging im Lazareth am 6. 1. 1881 mit einer Pneumonie des rechten Unterlappens zu, welche am 8. Krankheitstage (12. 1. 81) mit einer Krisis endete. Am folgenden Tage stellte sich jedoch das Fieber erneut ein und bestand dann mit mässigen Exacerbationen bei remittirendem Typus fort. Am 16. 1. wurde durch Probepunction ein serös-fibrinöses Exsudat nachgewiesen. Am 2. 2. hatte der Erguß hinten nahezu die Spina scapulae, vorn den oberen Rand der vierten Rippe erreicht, und eine wiederholte Untersuchung mittelst der Pravaz'schen Spritze konstatarie ein Empyem. Da sich Verdachtsmomente für Phthise geltend machten, so wurde von der Thoracotomie Abstand genommen und der Potain'sche Apparat in Anwendung gezogen.

Derfelbe entleerte am 2. 2. 350 ccm, am 9. 2. 200 ccm Eiter. Beide Punctionen erzeugten nur eine vorübergehende Defervescenz: nach der ersten Aspiration gelangte die Temperatur für 3, nach der zweiten für 5 Tage zur Norm. Eine intensivere Einwirkung auf den Eiterherd hoffte nun Herr Stabsarzt Dr. Solbrig dadurch zu erzielen, daß er nach Entfernung einer größeren Menge des Secretes den Rest durch eine 1%ige Lösung von Thymol verdünnte und darauf die so entstandene Mischung durch den verdünnte Luft enthaltenden Recipienten aspiriren liefs. Zu diesem Zweck verband er den Troicart des Potain'schen Aspirationsapparates mit einer Thymolwasser fassenden Irrigationsvorrichtung. So gelang es ihm, am 20. Februar etwa 300 ccm Eiter der Pleurahöhle zu entnehmen und 1000 ccm Thymollösung durchzuspülen. Der Erfolg entsprach keineswegs den gehegten Erwartungen: die Körpertemperatur wurde nicht beeinflusst. — Am 1. 3. gelangte das Verfahren erneut zur Anwendung. Diesmal wurden 750 ccm Eiter aspirirt und 3 Liter Thymollösung zur Ausspülung verwandt. Patient war dann 7 Tage fieberfrei. — Am 7. 3. stieg die Abendtemperatur auf 39,3°. Am 8. 3. Entleerung von 300 ccm Eiter und Irrigation mit 5 Liter Thymollösung. (Letztere wurde seit diesem Tage jedesmal so lange fortgesetzt, bis das specifische Gewicht der ablaufenden Flüssigkeit = 1000 war.) Resultat: 10tägiger afebriler Zustand. — Am 15. 3. constatirte die Probepunction noch immer purulentes Exsudat. Am 17. 3. wurden 350 ccm Eiter aspirirt und 2 Liter Thymolsolution durchgespült: 5 fieberfreie Tage. — Den 23. 3. Aspiration von 200 ccm Eiter und Durchspülung mit 7 Liter Thymollösung: 6 fieberfreie Tage. — Ein dann folgender 3 tägiger hochfebriler Zustand liefs eine neue Eiteransammlung vermuthen, doch förderte am 1. 4. der Apparat, trotzdem an 3 verschiedenen Stellen mit mittelfarkem Troicart punctirt wurde, nur etwa 50 Gramm einer dicken purulenten Flüssigkeit zu Tage. Die Temperatur fiel direct ab und hat sich bis

zu der am 25. Mai stattgehabten Entlassung des Patienten nur einmal (am 5. 4.) vorübergehend über die Norm erhoben.

Diese Thatfache allein rechtfertigt nahezu die Annahme, daß mindestens eine neue Eiterproduction seit dem 1. April nicht stattgefunden hat, um so mehr als bisher immer ein Nachschub sich durch heftiges Fieber markirte. Zudem wurde bei jeder Paracentese constatirt, daß die zu perforirenden Schwarten beständig an Mächtigkeit zunahmen. Das letzte Mal durchdrang der Troicart die harten, dicken Platten mit deutlich fühlbarem Knirschen und mußte fast bis zum hinteren Ende vorgeschoben werden, um in das Cavum thoracis zu gelangen. Diese stetig an Consistenz gewinnenden Membranen verkleinerten zweifellos theilweise durch ihren Umfang und theilweise dadurch, daß sie die Brustwandung dem von ihnen continuirlich ausgeübten Zuge zu folgen zwangen, die Abscesshöhle. Zugleich stieg das Zwerchfell erheblich in die Höhe, das Herz wurde nach rechts dislocirt.

Der nach der letzten Aspiration zurückgebliebene Eiter ist jedenfalls durch Resorption seiner flüssigen Bestandtheile eingedickt und dadurch seiner fiebererregenden Eigenschaft beraubt. —

Patient erschien bei seiner Entlassung blaß und ziemlich abgemagert, hatte jedoch in den letzten 3 Wochen um 3 Kg. an Gewicht gewonnen, fühlte sich auch kräftig und empfand außer zeitweisen kurzdauernden Hustenparoxysmen keine Beschwerden.

Die vordere rechte Thoraxwand war abgeflacht und eingefunken, die 7., 8. und 9. Rippe zwischen hinterer Axillar- und Scapularlinie kugelig hervorgewölbt, die Wirbelsäule scoliotisch (mit der Convexität nach links) verkrümmt. Bei der Inspiration blieb die rechte Thoraxhälfte auffallend zurück.

Die Percussion ergab über der rechten Lunge Dämpfung in einem Rayon, der abwärts bis zur unteren Lungengrenze nach oben vorn bis zum Sternalknorpel der 4. Rippe,

seitlich bis zur Axilla und hinten bis fast zur Spina scapulae reichte, die Auscultation im Bereich des Oberlappens abgeschwächtes, unten vorn und hinten aufgehobenes Athmungsgeräusch.

Sämmtliche drei beschriebenen Krankheitsfälle stellen Emphyeme dar, welche wie die Mehrzahl der zur Heilung kommenden sich im Anschluß an eine croupöse Pneumonie bildeten.

Der erste Fall wurde durch eine einfache Incision, der zweite durch Thoracotomie mittelst Rippenresection der Heilung entgegengeführt. Obgleich die Nachbehandlung bei beiden Patienten ebenmäßig in Drainirung, antiseptischen Irrigationen der Pleurahöhle und Application von Lister'schen Verbänden bestand, gestaltete sich der Verlauf doch wesentlich verschieden, insofern als bei S. der Verband sich oft als nahezu trocken erwies, während der Thorax nicht unbedeutende Quantitäten purulenter Flüssigkeit enthielt, dagegen bei F. regelmäßig das Secret gründlichen Abflufs fand. Parallel diesen Verhältnissen, wurde bei S. wiederholt Fieber, bei F. andauernd Apyrexie beobachtet.

Der dritte Fall verdankt seine relative Genesung einem Irrigationsverfahren, das im Princip nahezu der von Baelz angegebenen Methode entspricht. Nachdem die aspiratorische Punction allein kein befriedigendes Resultat in Aussicht stellte, vermochte sie im Verein mit exact angewandten antiseptischen Auspülungen durch Entlastung der Pleurahöhle und Verdünnung des geringen zurückbleibenden Eiterquantums die Resorption zu bewirken. Allerdings kam dieser Erfolg durch eine enorme Schwartenbildung zu Stande, welche, wie sicher anzunehmen ist, eine complete Atelectase des unteren und eine partielle Splenification des mittleren Lappens der rechten Lunge herbeiführte.

LITERATUR:

- Albert*, Lehrbuch der Chirurgie Bd. II.
- Hueter-Lossen*, Grundriss der Chirurgie. 2. Aufl. II. Bd.
- Heincke*, Compendium der chirurgischen Operations- und Ver-
bandlehre. 1. Aufl.
- v. Ziemssen*, Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie
Bd. IV, 2.
- v. Niemeyer-Scitz*, Lehrbuch der spec. Path. 10. Aufl. Bd. I.
- Puky*, Beiträge zur Behandlung der Pleuraaffectionen mittelst
Rippenresection. Archiv für klinische Chirurgie Bd. XXX.
Heft 1.
- Rosenbach*, Brustfellentzündung. (Eulenburg, Encyclopädie
Bd. II.)
- König*, Die antisept. Behandlung des Empyems. Berl. klin.
Wochenschr. Nr. 25. 1878.
- König*, Zur Operation des Empyems *ibid.* Nr. 43.
- Roser*, Zur Operation des Empyems. Berl. kl. Woch. 1878.
Nr. 46.
- Baelz*, Ueber Behandlung des Empyems ohne Incision etc.
Berl. kl. W. 1880 Nr. 3.
- Kashimura*, Behandlung des Empyems durch Punction mit
Auspülung *ibidem*.
- Goltdammer*, Ueber die Punction von Pleuraergüssen. Berl.
klin. W. 1880. Nr. 19 und 20. (Vortrag.)
- Verhandlungen der Berl. med. Gef. v. 17. 3. 1880. Discuf-
sion über obigen Vortrag.

Goldammer, Zur Aspiration pleuritischer Exsudate. Berl. kl. W. 1881 Nr. 47.

H. Smidt, Ueber Thoracocentese mittelst des Heberapparates. Berl. kl. W. 1881. Nr. 52.

Verhandlungen der Berl. medic. Gef. v. 19. 1. 81. *Goldammer*, Mittheilung zur Pleura-Punction. Discussion.

Zeitschrift für klin. Medicin Bd. III. *Fritz*, Zur Lehre von den Empyemen.
